

از کجا و چگونه به زگیل تناسلی مبتلا میشویم؟

میخواهید بدانید زگیل های تناسلی چگونه به وجود می آیند؟ در ادامه این مطلب علت به وجود آمدن زگیل تناسلی را برایتان توضیح میدهیم.

زگیل تناسلی توسط گونه های خاصی از **ویروس پاپیلوما ی انسانی (HPV)** ایجاد میشود. اچ پی وی یک عفونت مقاربتی است که میتواند از طریق رابطه جنسی واژینال، مقعدی یا دهانی و همچنین از طریق تماس نزدیک پوست به پوست در ناحیه تناسلی یا مقعدی منتقل شود). **علت زگیل تناسلی بدون رابطه جنسی)**

علت به وجود آمدن زگیل تناسلی این است که هنگامی که فردی به هر طریق با ویروس HPV تماس پیدا میکند، این ویروس میتواند از طریق بریدگی های کوچک یا خراش های پوستی وارد بدن شود. وقتی که ویروس وارد بدن میشود، میتواند سلول های پوست یا غشاهای مخاطی را آلوده کند و منجر به رشد زگیل شود.

در مورد زگیل تناسلی، ویروس در درجه اول نواحی تناسلی و مقعدی را تحت تاثیر قرار میدهد. زگیل های تناسلی میتوانند از نظر اندازه، شکل و ظاهر متفاوت باشند. آنها ممکن است از نظر ظاهری صاف، برجسته یا گل کلم مانند باشند و میتوانند به صورت منفرد یا خوشه ای ظاهر شوند). **گالری تصاویر زگیل تناسلی مردان و زنان)**

حالا که متوجه شدید که زگیل تناسلی چگونه به وجود می آید، توجه به این نکته هم ضروری است که همه افرادی که به ویروس HPV مبتلا میشوند، دچار زگیل های قابل مشاهده نمیشوند.

برخی از افراد ممکن است حامل ویروس بدون نشان دادن هیچ علامت یا علامتی باشند. علاوه بر این، در حالی که زگیل های تناسلی معمولاً خوش خیم هستند و با خطرات جدی سلامتی مرتبط نیستند، برخی از گونه های HPV میتوانند خطر ابتلا به برخی سرطانها مانند **سرطان دهانه رحم** در زنان و **سرطان مقعد** را در مردان و زنان افزایش دهند. بنابراین، مهم است که به دنبال مشاوره پزشکی و معاینات منظم باشید.

